

プロトコール名

乳がん－Pembrolizumab (Q3W) + PTX

1. 適応疾患：PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール													
	1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	84	1
Pembrolizumab (キイトルーダ) 200mg/body/日	●			●			●			●				●
PTX (パクリタキセル) 90mg/m ²	●	●	●		●	●	●		●	●	●			●

〈投与方法〉12週を1コース

〈評価方法〉8～18週ごとにCT等で評価

〈上限クール〉

Day1, 43, 64

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6 mg ファモチジン 20mg 生食 50mL	点滴	15分
②	グラニセトロン 3mg バック [®] 1袋	点滴	30分
③	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30分
④	生食 50mL	点滴	初回 30分 2回目以降全開
⑤	パクリタキセル _____ mg 生食 250mL	点滴	60分
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day8, 15, 29, 36, 57, 71

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6 mg ファモチジン 20mg 生食 50mL	点滴	15分
②	グラニセトロン 3mg バック [®] 1袋	点滴	30分
③	パクリタキセル _____ mg 生食 250mL	点滴	60分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day22

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保
②	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 (内服)

	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX投与60分前