

## プロトコール名

乳がん－Pembrolizumab (Q6W) + PTX

1. 適応疾患：PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

## 2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名<br>投与方法・投与量 (day)                  | 投与スケジュール |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|--|----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|  | 1        | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 84 | 1 |
| Pembrolizumab (キイトルーダ)<br>400mg/body/日 | ●        |   |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ● |
| PTX (パクリタキセル)<br>90mg/m <sup>2</sup>   | ●        | ● | ●  |    | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  |    |    | ● |

〈投与方法〉12週を1コース

〈評価方法〉8～18週ごとにCT等で評価

〈上限クール〉

## Day1, 43

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                | 投与方法 | ペース               |
|-----|--|------|-------------------|
| ①   | デキサート 6.6 mg<br>ファモチジン 20mg<br>生食 50mL | 点滴   | 15分               |
| ②   | グラニセトロン 3mg バック <sup>®</sup> 1袋        | 点滴   | 30分               |
| ③   | キイトルーダ 400mg<br>生食 100mL               | 点滴   | 30分               |
| ④   | 生食 50mL                                | 点滴   | 初回 30分<br>2回目以降全開 |
| ⑤   | パクリタキセル _____ mg<br>生食 250mL           | 点滴   | 60分               |
| ⑥   | 生食 50mL                                | 点滴   | 全開                |

Day8, 15, 29, 36, 57, 64, 71

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                | 投与方法 | ペース |
|-----|--|------|-----|
| ①   | デキサート 6.6 mg<br>ファモチジン 20mg<br>生食 50mL | 点滴   | 15分 |
| ②   | グラニセトロン 3mg バック <sup>®</sup> 1袋        | 点滴   | 30分 |
| ③   | パクリタキセル _____ mg<br>生食 250mL           | 点滴   | 60分 |
| ④   | 生食 50mL                                | 点滴   | 全開  |

Day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 (内服)

|   | 薬剤名と投与量      | 投与方法 | ペース        |
|---|--------------|------|------------|
| ① | レスタミンコーワ錠 5T | 内服   | PTX投与 60分前 |