

## プロトコール名

乳がん－Pembrolizumab + CBDCA (AUC5) + PTX

1. 適応疾患：高リスクの早期トリプルネガティブ乳がんへの周術期治療【術前①】

## 2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
	1	・	8	・	15	・	・	・	21	1
投与方法・投与量 (day)										
Pembrolizumab (キイトルーダ) 200mg/body/日	●									●
CBDCA (カルボプラチン) AUC5・min/mL/日	●									●
PTX (パクリタキセル) 80mg/m <sup>2</sup> /日	●		●		●					●

〈投与方法〉3週を1コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉4コース

## Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30分
④	生食 50mL	点滴	初回 30分 →2回目以降全開
⑤	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60分
⑥	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	60分
⑦	生食 50mL	点滴	全開

## Day8、15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分
②	グラニセトロンバッグ 3mg 1袋	点滴	30分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60分
④	生食 50mL	点滴	全開

## Day1, 8, 15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60分前

## Day2~4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分2 (朝・昼)