

プロトコール名

乳がん-weeklyPTX+フェスゴ (1サイクル目)

1. 適応疾患

HER2 陽性の乳がん(術前・術後薬物療法の場合は、PTX は 12 回まで、フェスゴの投与期間は合計 12 ヶ月まで)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
	1	...	8	...	15	...	21	1 (2 サイクル目以降)
PTX(パクリタキセル) 80mg/m ²	●		●		●			●
フェスゴ配合皮下注 IN (初回用量)	●							● MA (維持用量)

IN : 15mL (ペルツズマブ 1200mg+トラスツズマブ 600mg)

MA : 10mL (ペルツズマブ 600mg+トラスツズマブ 600mg)

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとする

〈評価方法〉 周術期：投与終了後(術後 1 年)を目途に CT 等での画像評価

転移・再発：3~4 コースを目途に CT 等で画像評価

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	グラニセトロン 3mg バック [®] 1 袋	点滴	30 分
③	フェスゴ配合皮下注 IN (初回用量) 15mL	皮下注 (大腿部)	8 分以上かけて
④	生食 50mL	点滴	30 分 (経過観察用)
⑤	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day8, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分
②	グラニセトロン 3mg ^{ハック} 1袋	点滴	30分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day1, 8, 15(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	PTX 投与 60分前