

プロトコール名

乳がん-weeklyPTX+フェスゴ (2サイクル以降)

1. 適応疾患

HER2 陽性の乳がん(術前・術後薬物療法の場合は、PTX は 12 回まで、フェスゴの投与期間は合計 12 ヶ月まで)

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名 | 投与スケジュール | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----|---|-----|----|-----|----|---|
| 投与方法・投与量 (day) | 1 | ... | 8 | ... | 15 | ... | 21 | 1 |
| PTX(パクリタキセル) 80mg/m ² | ● | | ● | | ● | | | ● |
| フェスゴ配合皮下注 MA (維持用量) | ● | | | | | | | ● |

IN：15mL (ペルツズマブ 1200mg+トラスツズマブ 600mg)

MA：10mL (ペルツズマブ 600mg+トラスツズマブ 600mg)

〈投与方法〉3週を1コースとする

〈評価方法〉周術期：投与終了後(術後1年)を目途にCT等での画像評価

転移・再発：3~4コースを目途にCT等で画像評価

Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|--|--------------|---------|
| ① | デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL | 点滴 | 30分 |
| ② | グラニセトロン 3mg ^{ハック} 1袋 | 点滴 | 30分 |
| ③ | フェスゴ配合皮下注 MA (維持用量) 10mL | 皮下注 (大腿部) | 5分以上かけて |
| ④ | パクリタキセル _____mg 生食 250mL | 点滴 | 60分 |
| ⑤ | 生食 50mL | 点滴 | 全開 |

Day8, 15

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|--|------|-----|
| ① | デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL | 点滴 | 30分 |
| ② | グラニセトロン 3mg ^{ハック} 1袋 | 点滴 | 30分 |
| ③ | パクリタキセル _____mg 生食 250mL | 点滴 | 60分 |
| ④ | 生食 50mL | 点滴 | 全開 |

Day1, 8, 15(内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|-------------------|------|----------------|
| ① | レスタミンコーワ(10mg) 5T | 内服 | PTX 投与 60分前 |