

プロトコール名

乳がん－Eribulin＋フェスゴ（1サイクル目）

1. 適応疾患：HER2 陽性の転移・再発乳がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
	1	・・・	8	・・・	15	・・・	21	1 (2 サイクル目以降)
投与方法・投与量 (day)								
Eribulin(エリブリン) 1.4mg/m ²	●		●					●
フェスゴ配合皮下注 IN (初回用量)	●							● MA (維持用量)

IN：15mL（ペルツズマブ 1200mg+トラスツズマブ 600mg）

MA：10mL（ペルツズマブ 600mg+トラスツズマブ 600mg）

〈投与方法〉3週を1コースとする

〈評価方法〉3～4コースを目途にCT等で画像評価

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 6.6mg 100mL	点滴	30分
②	フェスゴ配合皮下注 IN (初回用量) 15mL	皮下注 (大腿部)	8分以上かけて
③	生食 50mL	点滴	30分 (経過観察用)
④	エリブリン 生食 _____mg 50mL	点滴	5分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 6.6mg 100mL	点滴	30分
②	エリブリン 生食 _____mg 50mL	点滴	5分
③	生食 50mL	点滴	全開