

プロトコールNo.020268登録日：2025年2月12日

プロトコール名

乳がん－Sacituzumab Govitecan

1. 適応疾患：化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

## 2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
	1	...	8	...	...	...	21	1
Sacituzumab Govitecan (トロデルビ) 10mg/kg/日	●		●					●

〈投与方法〉3週を1コース

〈評価方法〉4～6サイクル毎にCT等で評価し、病勢が増悪するまで継続する。

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	トロデルビ _____mg 生食 250mL ※275mg 未満は生食 100mL、850mg 超は生食 500mLに変更(最終濃度 1.1～3.4mg/mLとする)	点滴	初回 180分 →2回目以降 60分
④	生食 50mL	点滴	全開

## Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	トロデルビ _____mg 生食 250mL ※275mg 未満は生食 100mL、850mg 超は生食 500mLに変更(最終濃度 1.1~3.4mg/mLとする)	点滴	60分
④	生食 50mL	点滴	全開

## Day1、8 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 10mg 5T カロナール 500mg 1T	内服	トロデルビの 投与 30分前