

## プロトコール名

胃がん－CAPOX (Capecitabine + L-OHP) + Zolbetuximab (2サイクル目以降)
------------------------------------------------------------

1. 適応疾患：CLDN18.2 陽性かつ HER2 陰性の治療切除不能進行・再発胃がん

## 2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール									
	1	・	・	・	14	・	・	・	21	1
Cape (カペシタビン) 2000mg/m <sup>2</sup> /日	●	●	●	●	●					●
L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m <sup>2</sup> /日	●									●
Zolbetuximab (ビロイ) 600 mg/m <sup>2</sup> /日	●									●

## Cape 用量

体表面積	1回用量(錠数)	1日用量(錠数)
1.36 m <sup>2</sup> 未満	1200mg(4錠)	2400mg(8錠)
1.36 m <sup>2</sup> 以上 1.66 m <sup>2</sup> 未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
1.66 m <sup>2</sup> 以上 1.96 m <sup>2</sup> 未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
1.96 m <sup>2</sup> 以上	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉 CTにより RECIST 基準により評価

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉

・ Zolbetuximab の投与速度について

初回で悪心・嘔吐なく投与できた場合は 2 時間(300mg/m<sup>2</sup>/時)で投与

初回に悪心・嘔吐があり減速している場合は初回の最大投与速度から開始し、30 分後に 300mg/m<sup>2</sup>/時(残りを 2 時間ペース)へ UP

## Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg ポララミン 5mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ビロイ _____mg 生食 _____mL 注射用蒸留水(溶解用) 100mL ※100mg : 1V/Aq 5mL で溶解 ※300mg : 1V/Aq 15mL で溶解	点滴	120分
④	生食 50mL	点滴	全開
⑤	オキサリプラチン _____mg 5%ブドウ糖 500mL	点滴	120分
⑥	5%ブドウ糖 100mL	点滴	L-OHPと同じペースで

## Day1~14(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	カペシタビン _____mg	内服	分2(朝夕食後) day1 夕~内服

## Day1~21(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ピドキサール(10) 6T	内服	分3(毎食後) day1 夕~内服

## Day2~3(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分2(朝・昼)