

プロトコール名

胃がん-CAPOX (Capecitabine+L-OHP)+Trastuzumab+Pembrolizumab (1サイクル目)

1. 適応疾患：HER2 陽性の治癒切除不能進行・再発胃がん（1st line）CPS \geq 1

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール									
	1	2	・	・	・	14	・	・	21	1
Cape (カペシタビン) 2000mg/m ² /日	●	●	●	●	●	●				●
Pembrolizumab(キイトルーダ) 200mg/body	●									●
T-mab(トラスツズマブ) 8mg/kg/日	●									● 6mg/kg
L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m ² /日	●									●

Cape 用量 (C 法)

体表面積	1 回用量(錠数)	1 日用量(錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg(4 錠)	2400mg(8 錠)
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1500mg(5 錠)	3000mg(10 錠)
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1800mg(6 錠)	3600mg(12 錠)
1.96 m ² 以上	2100mg(7 錠)	4200mg(14 錠)

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 CT により RECIST 基準により評価

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉 1 コース (L-OHP は最大 8 サイクルまで、Pembrplizumab は最大 35 サイクルまで)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ピドキサール(10) 6T×21 日	内服	分3 (毎食後) day1 夕～内服
②	カペシタビン _____mg×14 日	内服	分2 (朝夕食後) day1 夕～内服
③	デキサート 8.25mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開
⑥	トラスツズマブ _____mg 生食 250mL 注射用水(溶解用) 20mL	点滴	90 分
⑦	生食 100mL	点滴	60 分
⑧	オキサリプラチン _____mg 5%ブドウ糖 500mL	点滴	120 分
⑨	5%ブドウ糖 100mL	点滴	L-OHP と同じ ペースで