

プロトコール名

| |
|---|
| 胃がん-CAPOX (Capecitabine+L-OHP)+Trastuzumab+Pembrolizumab (2サイクル目以降) |
|---|

1. 適応疾患：HER2 陽性の治癒切除不能進行・再発胃がん（1st line）CPS \geq 1

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名 投与方法・投与量（day） | 投与スケジュール | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|---|----|---|---|----|---|
| | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 14 | ・ | ・ | 21 | 1 |
| Cape（カペシタビン） 2000mg/m ² /日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● |
| Pembrolizumab（キイトルーダ） 200mg/body | ● | | | | | | | | | ● |
| T-mab（トラスツズマブ） 6mg/kg/日 | ● | | | | | | | | | ● |
| L-OHP（オキサリプラチン） 130mg/m ² /日 | ● | | | | | | | | | ● |

Cape 用量（C 法）

| 体表面積 | 1 回用量(錠数) | 1 日用量(錠数) |
|---|-------------|--------------|
| 1.36 m ² 未満 | 1200mg(4 錠) | 2400mg(8 錠) |
| 1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満 | 1500mg(5 錠) | 3000mg(10 錠) |
| 1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満 | 1800mg(6 錠) | 3600mg(12 錠) |
| 1.96 m ² 以上 | 2100mg(7 錠) | 4200mg(14 錠) |

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 CT により RECIST 基準により評価

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉 無

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|---|------|------------------------|
| ① | ピドキサール(10) 6T×21日 | 内服 | 分3 (毎食後) day1 夕～内服 |
| ② | カペシタビン _____mg×14日 | 内服 | 分2 (朝夕食後) day1 夕～内服 |
| ③ | デキサート 8.25mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL | 点滴 | 30分 |
| ④ | キイトルーダ 200mg 生食 100mL | 点滴 | 30分 |
| ⑤ | 生食 50mL | 点滴 | 全開 |
| ⑥ | トラスツズマブ _____mg 生食 250mL 注射用水(溶解用) 20mL | 点滴 | 30分 |
| ⑦ | オキサリプラチン _____mg 5%ブドウ糖 500mL | 点滴 | 120分 |
| ⑧ | 5%ブドウ糖 100mL | 点滴 | L-OHPと同じ ペースで |