

登録区分	登録	入・外
------	----	-----

プロトコール名

胆道がん－Pembrolizumab＋GEM（維持療法）(Q6W)

1. 適応疾患： 治癒切除不能胆道がん
2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量（day）	投与スケジュール											
	1	・	8	・	・	22	・	29	・	42	1	
Pembrolizumab(キイトルーダ) 400mg/body	●											●
GEM(ゲムシタビン) 1000mg/m ² /日	●		●			●		●				●

〈投与方法〉 6週間を1コース

※Pembrolizumab＋CDDP＋GEM（最大8コース）が終了後に維持療法として使用

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉 14コース(Pembrolizumab：最大2年間まで)

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロンバッグ 3mg	点滴	15分
②	キイトルーダ 400mg 生食 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開
④	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8、22、29

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロンバッグ 3mg	点滴	15分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開