

登録区分	登録	入院	外来
------	----	----	----

プロトコール名

ホジキンリンパ腫－A-AVD
(Brentuximab Vedotin+DXR+VLB+DTIC)

1. 適応疾患：進行期ホジキンリンパ腫(未治療の CD30 陽性のホジキンリンパ腫)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール							
	1	2~4	・	15	16~18	・	28	1
Brentuximab Vedotin(アドセトリス) 1.2mg/kg/日(最大 120mg/日)	●			●				●
DXR(ドキシソルピシン) 25mg/m ² /日	●			●				●
VLB(エクザール) 6mg/m ² /日(最大 10mg/日)	●			●				●
DTIC(ダカルバジン) 375mg/m ² /日	●			●				●
pegfilgrastim 3.6mg/body/日		●			●			

※pegfilgrastimは抗がん剤投与後

day2以降 day4以内に1回、day16以降 day18以内に1回皮下注射を行う。

〈投与方法〉 4週を1コース

〈上限クール〉 6コース

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	ソリタ T3	500mL	点滴	4 時間
②	アロカリス パロノセトロン 生食	235mg 0.75mg 100mL	点滴 側管から	30 分
③	エクザール 生食	_____mg 20mL	静注 側管から	ゆっくり
④	ドキシソルビシン 生食	_____mg 100mL	点滴 側管から	30 分
⑤	ダカルバジン 生食	_____mg 250mL	点滴 側管から	60 分
⑥	ソル・コーテフ 生食	100mg 50mL	点滴 側管から	30 分
⑦	生食 (ルートフラッシュ用)	50mL	点滴 側管から	全開
⑧	アドセトリス 生食 蒸留水(溶解用 1V/10.5mL で溶解)	_____mg 100mL 20mL×2	点滴 側管から	60 分
⑨	生食	50mL	点滴 側管から	治療後

Day2~4 の間に 1 回, Day16~18 の間に 1 回投与

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	ペグフィルグラスチム	3.6 mg	皮下注	

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	ロキソプロフェン(60mg) レスタミンコーワ(10mg)	1T 5T	内服	アドセトリス の 30 分前