

プロトコールNo.120271登録日：2021年3月24日

登録区分	登録	入院	外来
------	----	----	----

プロトコール名

非ホジキンリンパ腫－A-CHP (Brentuximab Vedotin + CPA + DXR + PSL)
--

1. 適応疾患：未治療の CD30 陽性の末梢性 T 細胞性リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール										
	1	2	3	4	5	・	・	・	21	1	
Brentuximab Vedotin(アドセトリス) 1.8mg/kg/日(最大 180mg/日)	●										●
CPA(エンドキサン) 750mg/m <sup>2</sup> /日	●										●
DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m <sup>2</sup> /日	●										●
PSL(プレドニゾン) 100mg/body/日	●	●	●	●	●						●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉 8クール

## Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	5 時間
②	パロノセトロン 生食 0.75mg 100mL	点滴 側管から	30 分
③	エンドキサン 生食 _____mg 500mL	点滴 側管から	120 分
④	ドキシソルビシン 生食 _____mg 100mL	点滴 側管から	30 分
⑤	生食 50mL (ルートフラッシュ用)	点滴 側管から	全開
⑥	アドセトリス 生食 蒸留水(溶解用 1V/10.5mL で溶解) ※投与量が 150mg 以上の場合、生食 250mL に変更 _____mg 100mL 20mL×2	点滴 側管から	60 分
⑦	生食 50mL	点滴 側管から	治療後

## Day1～5 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン(5mg) 20 錠	内服	分 2 (朝、昼)

## Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アプレピタントカプセル(125mg) 1cap	内服	治療開始前
②	ロキソプロフェン(60mg) レスタミンコーワ(10mg) 1 錠 5 錠	内服	アドセトリス の 30 分前

## Day2～3(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アプレピタントカプセル(80mg) 1cap	内服	分 1 (朝)