

プロトコールNo.130238

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 登録区分 | 登録 | 入・外 |
|------|----|-----|

## プロトコール名

多発性骨髄腫－DLd 皮下(3～6サイクル)

1. 適応疾患：多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名<br>投与方法・投与量 (day)                      | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |   |    |   |   |
|--|----------|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|---|----|---|---|
|  | 1        | 2 | ・ | 8 | 9 | ・ | 15 | 16 | ・ | 21 | 22 | 23 | ・ | 28 | 1 |   |
| Daratumumab(ダラキューロ)<br>1800mg/body/日 (皮下注) | ●        |   |   |   |   |   | ●  |    |   |    |    |    |   |    |   | ● |
| Dx(デキサート or レナテックス)<br>20mg/body/日         | ●        | ● |   | ● | ● |   | ●  | ●  |   |    | ●  | ●  |   |    |   | ● |
| Lenalidomide(レナトミド)<br>25mg/body/日         | ●        | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ● | ●  |    |    |   |    |   | ● |

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉血清検査、画像検査など

〈上限クール〉4クール

Day1, 15

| 投与順 | 薬剤名と投与量                        | 投与方法             | ペース   |
|-----|--------------------------------|------------------|-------|
| ①   | デキサート<br>生食<br>19.8mg<br>100mL | 点滴               | 30分   |
| ②   | アセリオ<br>1000mg                 | 点滴               | 15分   |
| ③   | 生食<br>100mL                    | 点滴               | 60分   |
| ④   | ダラキューロ<br>1800 mg (15mL)       | 皮下注<br>(腹部に翼状針で) | 約3～5分 |

## Day1, 15 (内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量            | 投与方法 | ペース            |
|-----|--------------------|------|----------------|
| ①   | レスタミンコーワ (10mg) 5T | 内服   | 治療開始<br>1~3h 前 |

## Day1~21 (内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量     | 投与方法 | ペース |
|-----|-------------|------|-----|
| ①   | レナリドミド 25mg | 内服   |     |

## Day2, 8, 9, 16, 22, 23 (内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量     | 投与方法 | ペース |
|-----|-------------|------|-----|
| ①   | レナデックス 20mg | 内服   |     |