

登録区分	登録	入・外
------	----	-----

プロトコール名

多発性骨髄腫－IsaKd (2 サイクル目以降)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫
2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
	1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	23	・	28	1
Isatuximab(サークリサ) 10mg/kg/日	●						●							●
Carfilzomib(カイプロリス) 56mg/m ² /日	●	●		●	●		●	●						●
Dx(デキサメタゾン)内服 20mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●			●

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉血清検査、画像検査など

〈上限ルール〉

Day1,15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アセリオ 1000mg	点滴	15分
②	生食 50mL	点滴	15分
③	サークリサ _____mg 生食 _____mL (全量で250mL)	点滴	200mL/h
④	カイプロリス(56mg/m ²) _____mg 蒸留水(溶解用) 100mL (10mgは1V/5mL,40mgは1V/20mLで溶解) 5%ブドウ糖液 100mL (投与量が100mg超過時は80mL)	点滴	30分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※IRが発現した場合

- ・Grade3以上は投与を中止。Grade2は1以下になるまで休薬する。
- ・症状が改善した場合は、投与開始速度の半分の投与速度で患者の状態を観察しながら再開できる。
- ・投与再開30分後までにIRの再発が認められなかった場合には以下の如く投与速度を上げられる。

0～30分	: 100mL/h
30～60分	: 150mL/h
60分～	: 200mL/h

Day2,8,9,16

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カイプロリス(56mg/m ²) _____mg 蒸留水(溶解用) 100mL (10mgは1V/5mL,40mgは1V/20mLで溶解) 5%ブドウ糖液 100mL (投与量が100mg超過時は80mL)	点滴	30分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day1,15(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	サークリサ投与 15～60分前
②	ファモチジン(20mg) 1T	内服	サークリサ投与 15～60分前

Day1,2,8,9,15,16,22,23(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサメタゾン 20mg	内服	分1