

登録区分	登録	入・外
------	----	-----

プロトコール名

多発性骨髄腫—IsaBLd(皮下投与)(18 サイクル以降)

1. 適応疾患：多発性骨髄腫
2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	・	21
Isatuximab(サークリサ) 10mg/kg/日	●																
Lenalidomide(レナリドミド) 25mg/body/日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dx(デキサート or レナデックス) 20 mg/body/日	●							●							●		

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール						
	22	23	24	25	26	27	28
Isatuximab(サークリサ) 10mg/kg/日							
Lenalidomide(レナリドミド) 25mg/body/日							
Dx(デキサート or レナデックス) 20 mg/body/日	●						

〈投与方法〉4週(28日)を1コースとする

〈評価方法〉血液検査(Mタンパク量)、画像検査

〈併用レジメン〉なし

〈上限クール〉なし

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 19.8mg 100mL	点滴	30分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15分
③	生食 50mL	点滴	15分
④	サークリサ _____mg 生食 _____mL (全量で 250mL)	点滴	200mL/h
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※IRが発現した場合

- ・Grade3以上は投与を中止。Grade2は1以下になるまで休薬する。
- ・症状が改善した場合は、投与開始速度の半分の投与速度で患者の状態を観察しながら再開できる。
- ・投与再開30分後までにIRの再発が認められなかった場合には以下の如く投与速度を上げられる。

0～30分	: 100mL/h
30～60分	: 150mL/h
60分～	: 200mL/h

Day1～21 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナリドミド 25mg	内服	分1

Day8, 15, 22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 20mg	内服	

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	サークリサ投与 15～60分前
②	ファモチジン (20mg) 1T	内服	サークリサ投与 15～60分前