

プロトコールNo.140257

登録日： 年 月 日

登録区分	登録	入院・外来
------	----	-------

プロトコール名

急性骨髄性白血病－Azacitidine＋Venetoclax

1. 適応疾患：急性骨髄性白血病

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール														
	1	2	3	4	..	7	28	1	
Azacitidine(アザシチジン) 75mg/m ² /日	●	●	●	●	●	●									●
Venetoclax(ベネクレクスタ) ●1 サイクル目 day1 : 100mg/日 day2 : 200mg/日 day3～ : 400mg/日 ●2 サイクル目以降 400mg/日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

〈投与方法〉 4週を1コース

〈ベネクレクスタ投与時の注意〉

CYP3A 阻害剤との併用時の用量調節

併用薬剤	用量漸増期	維持投与期
中程度の CYP3A 阻害剤	本剤を半量以下に減量すること	本剤を半量以下に減量すること
強い CYP3A 阻害剤	本剤を1日目は10mg、2日目は20mg、3日目以降は50mgに減量すること	本剤を50mgに減量すること

Day1～7

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保
②	グラニセトロンバッグ 3mg 1袋	点滴 側管から	15分
③	アザシチジン _____mg 生食 50mL 注射用蒸留水(溶解用) 20mL	点滴 側管から	10分
④	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day1～28 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ベネクレクスタ ●1サイクル目 day1 : 100mg day2 : 200mg day4～ : 400mg ●2サイクル目以降 400mg	内服	