乳房部分切除術を受けられる

様の入院計画表

(患者ID:

岡山赤十字病院 病棟( ) 外科 主治医 受け持ち看護師 患者様署名(代理人署名) 入院時 手術前日 手術当日 手術後 手術後 手術後 手術後 手術後 手術後 日付 月  $\Box$ 月  $\Box$ 手術前 手術後 1日目 2日目 388 4日目 5日目 6~9日目以後 Н Н 月 Н 月 Я 月 日~ 日 創部に問題がない。 ・ 退院できる 達成 鎮痛剤を使用し、疼痛 手術の説明を受け、不安や疑問な点が質問できる。 日標 をコントロールできる。 離床の必要性を理解し、離床できる。 病状・手術について主治医が説明 手術直後、 腋窩リンパ節を 腋窩リンパ節を 主治医より家族の方 全部とった時 します。 とらなかった時 予定日時一 に手術についての 退院( / 退院( / ・入院生活・手術について、 今後の日常生活につ 今後の日常生活につ 説明があります。 看護師が説明します。 いて看護師がお話し いて看護師がお話し ・麻酔科医の手術前の訪問がありま 説明 します。 します。 ・パンフレットを見ながら、看護師がリハビリ、退院後・日常生活の注意点、自己検診や下着等について説明いたします。 手術室看護師の手術前の訪問があ ・腋窩リンパ節を全部とった場合は、手の挙上リハビリが必要です 下記のリハビリの欄をご覧ください。 ります。 また、腋窩リンパ節を全部とった場合は、手術をした側の手での、点滴・採血、血圧測定は原則禁止です。 パンフレットの説明を行います。 注意しましょう。 熱を測ります。 センチネルリンパ節生検がある方 血圧、脈拍、体温を 血圧、脈拍、体温を は胸に薬剤注入と撮影に地下に降 測ります。 測ります。 (朝•昼•夕) 検査 ります。 脇毛を剃り 弾性ストッキングを 点滴をします。 ます。 はきます。 胸に小雷図モニターを 爪切りをし 10時頃より点滴をし 付けます。 /// Щі ます。 ます。 抗生剤の点滴をしま 03 6 ・血栓予防の (午後から手術の場合) す。 胸の管を抜きます。 胸に管が入っています。 ため弾性ス ・手術衣(お持ちしま 処置 (手術後5~8日目) トッキング す) に着替えます。 (腋窩リンパ節を全部 排液50ml/日以下が 薬剤 を渡します。 とった時や状況に応じ 抜去の日安です。 て管が入ります。) で手術室へ行きます。 傷が痛む場合、 鎮痛剤を投与します。 安静度 自由です。 床上安静です。 自由です。 尿管を抜きま トイレへ歩いて行ってください。 尿の管が入っています。 トイレへ歩いて行ってください。 排泄 • トイレへ歩い て行ってくだ さい。 時から絶食です。 絶飲食です。 食事 普通食がでます。 時から絶飲食で 指示があれば水が飲め 朝から普通食がでます。 ます。 入浴またはシャ朝、シャワーを タオルを配り タオルで体を ・(胸の管なし)傷の絆創膏を水に濡れてもよいものに貼りかえたらシャワーができます ワーを浴びてく してください。 拭き着替えま ます。 清潔 (胸の管あり) 管が抜けたら、絆創膏を剥がすか濡れてもよい ださい。 す。 時間はこちらからお伝えします。 下半身のみシャワーができます。 ものに貼り替えてシャワーができます。 手術をした側の ボールを握ったり、 腕の下に枕を入れ、 指の運動をしてください。 リハビリ (医師の指示後) 浮腫を防止します。 日常動作を中で、 \*腋窩リン ・リハビリをします。 少しずつ手を使うように 痛みに応じて腕を動かして下さい。 パ節を全 ・ 腕の挙上運動を始め しましょう。 部とった ます。 (肘の関節から下の運動 時のみ を積極的に行いましょう。)

有・無 (どちらかに〇) 特別な栄養管理の必要性

入院時この用紙を持参してください。

岡山赤十字病院 開始年月: R1.12 改正: R4.12

年

月

 $\Box$ 

総合的な機能評価: 自立 ・ 一部介助 ・ 全介助